

* clédial

médifoxamine

FORME ET PRÉSENTATION :

Comprimés (blancs) : boîte de 30.

COMPOSITION :

Médifoxamine (DCI) 50 mg 1,50 g
Excipient : phosphate dicalcique, cellulose microcristalline, amidon de maïs, stéarate de magnésium, talc.

PROPRIÉTÉS :

La médifoxamine est un antdépresseur tricyclique, ni inhibiteur de la mono-amine oxydase.

Elle présente chez l'animal des propriétés pharmacologiques prévisionnelles d'une activité antidépressive chez l'homme :
- réduction du temps d'immobilité au test de désespoir,
- correction des troubles comportementaux obtenus par l'ablation des bulbes olfactifs chez le rat,
- antagonisme de l'hypothermie et du plosis induits par la réserpine.

De plus, la médifoxamine se distingue par :
- l'absence de modification de l'activité locomotrice et exploratoire,
- un effet anticholinergique faible, aux doses actives sur les tests précédemment cités.

Elle n'a pas d'impact sérotoninergique, son mécanisme d'action met en jeu le système dopaminergique et, à un moindre degré, le système noradrénnergique.

SORT DU MÉDICAMENT :

Chez l'animal, le produit est rapidement absorbé au niveau duodénal (coefficient de résorption : 90 à 100 %). Il existe un effet de premier passage hépatique important. La liaison aux protéines plasmatiques est de l'ordre de 90 %. Le passage de la barrière hémato-encéphalique conduit à des concentrations au niveau cérébral supérieures à celles enregistrées au niveau sanguin. L'élimination du produit est rapide (70 à 90 % de la dose en 24 heures). Elle est essentiellement urinaire (60 à 80 %) et se fait sous forme de métabolites.

Chez l'homme, après administration orale, le pic plasmatique est obtenu en 45 minutes. La demi-vie d'absorption est d'environ 15 minutes, la demi-vie d'élimination, proche d'une heure.

INDICATIONS :

Etats dépressifs réactionnels.

CONTRE-INDICATIONS :

- Ne pas associer aux I.M.A.O. qui doivent être arrêtés 15 jours avant le début du traitement.
- Risque de glaucome par fermeture de l'angle.
- Risque de rétention urinaire lié à des troubles urétoprotastiques.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Une surveillance médicale est nécessaire, tant au point de vue psychique que somatique, en début de traitement.
- Une thérapeutique spécifique de l'anxiété, en particulier chez les patients à tendance suicidaire, peut être nécessaire, surtout en début de traitement.

- Prudence chez les sujets épileptiques ou ayant des antécédents épileptiques pour lesquels il peut être utile de renforcer la thérapeutique anti-comitiale.

- La consommation d'alcool est fortement déconseillée.
- L'indulgence en présence d'une hypotension et chez des malades présentant des antécédents cardiaques ou athéromateux.

- GROSSESSE : bien que l'administration chez l'animal n'ait

causé aucune malformation fœtale, l'innocuité d'un tel traitemen

tement au cours de la grossesse n'a pas été établie.

- ALLAITEMENT : chez le rat, le produit est éliminé dans le lait.

VIGILANCE ET CONDUITE : Bien que, chez le sujet sain, l'administration de Clédial n'entraîne aucun effet secondaire défavorable sur le niveau de vigilance, l'attention est appelée, notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines, sur les risques de somnolence.

INTERACTIONS MÉDAMENTEUSES :

- Il n'y a pas, chez l'animal, de modification de l'activité des produits suivants : imipramine, aspirine, alpha-méthyldopa, clonidine, phenindione, tolbutamide en association avec la médifoxamine. Par contre, l'association à la médifoxamine potentie l'action du diazépam et de la morphine.
- Prendre en compte l'addition des effets anticholinergiques faibles (cf. effet indésirable) en cas d'association entre autres avec : antihistaminiques, neuroleptiques, antiparkinsoniens, anticholinergiques, antispasmodiques atropiniques, disopyramide, antdépresseurs tricycliques.

EFFETS INDÉSIRABLES :

- Quelques cas de gastralgies, hypotension, somnolence, bouche sèche, troubles visuels, céphalées ont été rapportés. Ils n'ont jamais entraîné d'interruption du traitement.
- Incidents liés à la nature même de la maladie traitée (levée de l'inhibition psychomotrice avec risque suicidaire, inversion trop rapide de l'humeur, apparition d'un délire chez les sujets psychotiques).

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE :

La posologie moyenne est de 3 comprimés par jour, en trois prises, de préférence en dehors des repas.
Coût du traitement journalier : 4,88 F.

DURÉE DE STABILITÉ : 3 ans

SURDOSAGE :

Évacuation rapide du ou des produits ingérés.
Hospitalisation immédiate dans un centre spécialisé.
Il n'existe pas d'antidote spécifique.

TABLEAU C

A.M.M. 325 866.7 (1982) - Mis sur le marché en 1983.

PRIX : 48,80 F + S.H.P. (30 comprimés).
Remb. Séc. Soc. à 70 % - Collect.

ASSOCIATION SCIENTIFIQUE DES PSYCHIATRES DE SERVICE PUBLIC REGION NORD - PAS-DE-CALAIS.

JOURNÉE SCIENTIFIQUE 27 OCTOBRE 1989

ACTUALITE DES PSYCHOTROPES

**Nous remercions les laboratoires Anphar
Rolland pour la réalisation et le routage
de ce programme.**

Laboratoires ANPHAR-ROLLAND
B.P. 203 - 91007 ÉVRY Cedex
Tél. : (1) 64 97 20 30

LILLE

Salle des Congrès de
la Faculté de Médecine - C.H.R.
1, place de Verdun

MATINEE

- 9 h 30 : Accueil
- 10 h 00 à 12 h 30 :
Sous la présidence de
Monsieur le Professeur PARQUET

Docteur PUECH (Paris)
*De la pharmacologie à la prescription
des psychotropes.*

Docteur SECHTER (Lille) - discutant
- 11 h 00 : Pause
- 11 h 15 : Débat

REPAS POSSIBLE SUR PLACE
(Ecole d'infirmières)

APRES-MIDI

- 14 h 30 à 17 h 00 :
Sous la présidence de
Monsieur le Professeur GOUDEMAND

Docteur GOFFINET (Bruxelles)
Acquis récents sur les anti-dépresseurs

Docteur SECHTER (Lille) - discutant

Docteur SEGHERS (Bruxelles) - discutant
- 15 h 30 : Pause
- 15 h 45 : Débat
- 17 h 15 : Assemblée générale
de l'association scientifique.

BULLETIN D'INSCRIPTION

NOM

PRENOM

ADRESSE

TEL.

Frais d'inscription

- Membre de l'Association 100 F
- Non membre 150 F
- Etudiant 50 F
- Repas non compris 50 F

Bulletin à retourner accompagné du règlement à :

ASSOCIATION SCIENTIFIQUE
DES PSYCHIATRES DE SERVICE PUBLIC
REGION NORD - PAS-DE-CALAIS
Docteur J.-J. AUSSEILL
C.H.S. de Lommelet - B.P. N° 4
59871 SAINT-ANDRE cedex
Tél. 20 51 60 94